

AZUFRE MOJABLE (WP)

- FUNGICIDA INORGÁNICO
- DE CONTACTO
- ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA
- PREVIENE EL OIDIO O QUINTAL
- TIENE EFECTO SECUNDARIO PARA EL CONTROL DE ACAROS Y ERIÓFIDOS



ISCAMEN

INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA MENDOZA

www.iscamen.com.ar

0800 666 4722



APLICACIÓN EN VID

EN FORMA PREVENTIVA:	EN FORMA CURATIVA:
Dosis: 100 gr / 100 lit	Dosis: 250 gr / 100 lit.
Momento: En otoño antes de la caída de hojas hasta floración.	Momento: Cuando se presentan las condiciones para el desarrollo de la enfermedad y/o cuando se observen los primeros síntomas.
VOLUMEN DE APLICACIÓN POR HECTAREA: VARIA EN FUNCION DE LA MASA FOLIAR. RECOMENDACIÓN: SUSPENDER ANTES DEL ENVERO NO APLICAR CON TEMPERATURAS SUPERIORES A 25°C	

APLICACIÓN EN FRUTALES - control de oidio

Cultivos	Momento de aplicación	Dosis
CAROSOS (DURAZNOS)	Desde yema hinchada. Repetir si aparecen síntomas.	250 gr / 100 lit
PEPITAS (PERAS Y MANZANAS)	Antes de plena flor y después de caída de pétalos.	

PREPARACIÓN DEL CALDO

- 1 El tanque de la pulverizadora debe tener **un tercio o la mitad de agua** de su capacidad y debe estar el agitador funcionando.
- 2 En un balde de **20 litros** se realiza la premezcla y se coloca la dosis a aplicar, por ejemplo: se vierten **2,5 kg de azufre** en el balde lentamente y se revuelve. La pasta formada se vuelca en el tanque de la pulverizadora que se encuentra con el agitador en funcionamiento. La premezcla con la dosis por hectárea puede realizarse en dos etapas para facilitar el mezclado.
- 3 Una vez **volcada la premezcla** en el tanque de la pulverizadora, se completa con agua el tanque de la misma estando el agitador en movimiento.

CUIDADOS PERSONALES

Utilizar Equipo de Protección Personal (EPP):

- Protección respiratoria
- Protección ocular
- Guantes impermeables
- Botas de goma
- Delantal impermeable

Estos elementos deben ser utilizados durante todo el proceso de preparación del caldo y en la aplicación.