



SR. VIÑATERO

**Para el control de la
“Cochinilla harinosa
de la vid”**

**CURAR Sin ASESORARSE...
...es el PEOR REMEDIO.**


¿Qué es la “Cochinilla harinosa de la vid”?

Es un insecto que pasa el invierno como huevo bajo la corteza de las cepas. Presenta al menos 6 generaciones en Mendoza y San Juan. La **Cochinilla harinosa de la vid** completa su ciclo biológico -desde huevo hasta adulto- entre 30 y 60 días según las temperaturas y cada hembra coloca 400 huevos en promedio. La hembra adulta es de cuerpo ovalado y de color blanquecino, cubierto por una delgada capa de cera. Su tamaño es de 3 a 4mm de largo y los machos son más pequeños y alados. En el invierno se refugia en los troncos pero a fines de la primavera se dirige a hojas y racimos. También es posible encontrar esta plaga en malezas de la zona, tanto en raíces como en tallos y hojas.



¿Qué daños provoca?

- ✓ Succiona la savia de las plantas afectando su desarrollo.
- ✓ Produce sustancias azucaradas -"melazas o arroyo"- que impregnan los frutos y permiten el desarrollo de hongos que desvalorizan el producto, especialmente cuando se trata de uvas para consumo en fresco.
- ✓ Transmite virus que provocan disminuciones en los rendimientos
- ✓ Es una plaga Cuarentenaria para algunos países. Esto podría ocasionar rechazos de partidas en uvas de mesa.
- ✓ La presencia de residuos de insecticidas en mostos puede generar rechazos.
- ✓ Aparentemente, la presencia de grandes poblaciones modifica las características organolépticas de las uvas destinadas a vinificación.



¿Existen enemigos naturales ?

Existe un control ejercido por sus enemigos naturales, por ejemplo vaquitas, pequeñas avispas y otros que han mantenido las poblaciones de **Cochinilla harinosa de la vid** en niveles muy bajos y prácticamente no detectables hasta la actualidad.

Tenga en cuenta que la aplicación de productos agroquímicos, sin un diagnóstico preciso, puede afectar a los enemigos naturales de la plaga y favorecer su desarrollo.

¿Existen insectos que favorecen su desarrollo?

Las hormigas contribuyen al desarrollo de esta plaga ya que la protegen de sus enemigos naturales. ***Una Práctica recomendable es el control de hormigueros.***

¿Cómo se puede controlar?

- ✓ **Recorra cuidadosamente los viñedos:**
La existencia de melaza o arrope y hormigas, son el mejor indicador de la posible presencia de la plaga. Observe si la plaga se encuentra presente en las plantas ornamentales cercanas a la vivienda, especialmente parrales caseros.
- ✓ **Impida que la plaga se disperse:**
***Los** insectos viajan en los elementos de trabajo como tijeras de podar, ropa de los operarios, tractores e implementos y los materiales usados en la cosecha: tachos, tijeras y carpas. Lave y desinfecte los implementos que utilice cuando los vaya a usar en cultivos sanos.
*Controle hormigueros y malezas.
*Permita la entrada de sol a los racimos ya que la **Cochinilla harinosa de la vid se protege** de la luz y la oscuridad favorece su desarrollo.
- ✓ Ubique y **marque las plantas o los manchones afectados por la plaga para darles un tratamiento diferenciado:**
***No las pode** con los mismos implementos que utiliza para las plantas sanas. *En plantas muy afectadas realice el descortezado de los troncos para impedir que la plaga se refugie durante el invierno. Queme inmediatamente los desechos.
*Sólo las plantas **afectadas deben recibir tratamientos con agroquímicos registrados y autorizados para su uso en vid en Argentina.**
***En lo posible coseche** y transporte la producción afectada separada del resto.
- ✓ Cuando implante **nuevos viñedos, verifique que las plantas del vivero no están afectadas.**
- ✓ **Asesórese con su técnico de confianza.**

1

Nunca realice tratamientos generalizados con insecticidas. Solamente trate las plantas atacadas, con agroquímicos registrados y autorizados para su uso en vid en Argentina. Los tratamientos deben finalizar 70 días antes de cosecha. Evite problemas, respete los tiempos de carencia.

2

Nunca utilice elementos de trabajo que se hayan usado en viñedos infectados. Tenga especial cuidado en la cosecha, asegúrese que el camión, la carpa y los tachos no han sido usados en viñedos atacados por la plaga.

Asesórese



**Instituto Nacional
de Tecnología
Agropecuaria**



MENDOZA

www.iscamen.com.ar

Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza

ISCAMEN



CONSULTAS GRATUITAS AL: 0800 666 4722